



CÓMO INFORMAR AL PEDIATRA

LA FIEBRE

LA FIEBRE ES UNO DE LOS SÍNTOMAS **MÁS FRECUENTES**, REPRESENTA HASTA UN TERCIO DE LOS PROBLEMAS PLANTEADOS AL PEDIATRA¹.

COMUNICAR
CORRECTAMENTE
LA FIEBRE AL PEDIATRA
ES FUNDAMENTAL PARA
RECIBIR UNA ATENCIÓN
ADECUADA.

PARA ELLO ES IMPORTANTE
QUE LOS PADRES OBSERVEN
CON ATENCIÓN AL NIÑO
Y COMUNIQUEN
PUNTUALMENTE ESTOS DATOS:²



CARACTERÍSTICAS

- Cuál es el valor máximo, dónde (zona del cuerpo) y cómo (tipo de termómetro) se ha medido
- Cómo se ha producido el aumento de la temperatura (¿Repentina o gradualmente?)



EVOLUCIÓN

- Cómo va evolucionando a lo largo del día (¿Fluctúa o es estable?)
- Posible aparición de otras molestias (ej. vómito, diarrea, dolor de garganta, tos, erupción cutánea)



ASPECTO DEL NIÑO

- Color de la piel (rosada, pálida, azulada)
- Comportamiento (¿Tranquilo o agitado? ¿Tiene apetito? ¿Está irritable o llora mucho? ¿Tiene ganas de jugar?)
- Respiración (¿Es regular? ¿Le cuesta respirar?) y reacción a los estímulos
- Consultar al pediatra para la posible administración de un antipirético y valorar la situación transcurridos 60-90 minutos (¿Duerme profundamente? ¿Está agitado? ¿Llora?)




FIEBRE DESPUÉS DE LA VACUNA

- Valores de la fiebre (normalmente entre 38 y 38,5 °C)
- Duración de la fiebre (normalmente de duración breve 24-48 horas)



Tomar **ibuprofeno o paracetamol** permite **tratar eficazmente tanto la fiebre como el posible dolor en la zona de la inyección**².



Escanea el
código QR
y descubre
los contenidos
especiales

RECUERDA:

Siempre ha de consultarse al pediatra, especialmente si el niño tiene menos de 6 meses o se encuentra muy mal.³

En caso de fiebre, es mejor no forzar al niño a comer, sino intentar que beba³.

