



COMMENT SIGNALER À SON PÉDIATRE

LA FIÈVRE

LA FIÈVRE EST L'UN DES SYMPTÔMES LES **PLUS FRÉQUENTS**,
JUSQU'À UN TIERS DES PROBLÈMES SOUMIS AUX PÉDIATRES¹

UNE BONNE COMMUNICATION
DE LA FIÈVRE AU PÉDIATRE
EST FONDAMENTALE
POUR UN TRAITEMENT
ADAPTÉ.

IL EST DONC IMPORTANT
POUR LES PARENTS
D'OBSERVER L'ENFANT
ATTENTIVEMENT ET DE
FOURNIR CES INFORMATIONS
AVEC PRÉCISION.²



CARACTÉRISTIQUES

- Quelle est sa valeur maximale, où (endroit du corps) et comment (type de thermomètre) elle a été mesurée
- Comment est survenue l'augmentation de la température (soudainement ou progressivement ?)



DÉROULEMENT

- Son évolution au cours de la journée (fluctuante ou stable ?)
- Présence éventuelle d'autres troubles (tels que vomissements, diarrhée, maux de gorge, toux, éruption cutanée)



ASPECT DE L'ENFANT

- Coloration de la peau (rose, pâle, bleutée)
- Comportement (Est-il calme ou agité ? A-t-il de l'appétit ? Est-il irritable ou pleure-t-il ? A-t-il envie de jouer ?)
- Respiration (Est-elle régulière ? Difficile ?) et réaction aux stimuli
- Consulter un pédiatre pour l'éventuelle administration d'un antipyrétique et évaluer l'état de l'enfant toutes les 60 à 90 minutes (dort-il profondément ? Est-il agité ? Pleure-t-il ?)



LA FIÈVRE POST-VACCINALE

- Valeurs de la fièvre (habituellement entre 38 et 38,5 °C)
- Durée de la fièvre (habituellement de courte durée (24 à 48 heures))

L'utilisation d'**ibuprofène** ou de **paracétamol** permet d'**affronter efficacement la fièvre tout comme l'éventuelle douleur au site d'injection²**



scannez le
QR code
et découvrez
les contenus
spéciaux

À RETENIR :

Le pédiatre est toujours la référence, surtout si l'enfant a moins de 6 mois ou qu'il se sent très mal³.

En cas de fièvre, il vaut mieux ne pas forcer l'enfant à manger, mais l'inviter à boire³.

