



LOS POSIBLES EFECTOS NO DESEADOS DE LAS VACUNAS

QUÉ HAY QUE SABER

Al igual que cualquier medicamento, las vacunas también pueden provocar **efectos no deseados** como:



HOMBRO Y MUSLO

Enrojecimiento o hinchazón en el punto de la inyección: no depende del enfermero y desaparecerá pasadas unas semanas.²



CUERPO

- El niño está un poco «pachucho»: no se encuentra bien y muestra irritabilidad durante 24-48 horas, pero se consuela con facilidad.²
- Erupción cutánea (exantema): aparece más a menudo con la vacuna del sarampión, pasados unos 7-10 días desde la inyección, y desaparece espontáneamente.³



ABDOMEN

Diarrea: puede producirse en el caso de vacunas orales como, por ejemplo, la del rotavirus.⁴




FIEBRE Y DOLOR

- **Fiebre:** caracterizada por valores entre 38 y 38,5°C y breve duración (24-48 horas), sin consecuencias.
- **Dolor:** en el lugar de la inyección, independientemente del enrojecimiento o hinchazón.

EFECTOS NO DESEADOS
LOCALES, ES DECIR,
EN LA ZONA DE LA INYECCIÓN O,
MÁS RARAMENTE,
EFECTOS NO DESEADOS
GENERALES COMO, POR EJEMPLO,
REACCIONES ALÉRGICAS¹



Si es preciso, tomar **ibuprofeno o paracetamol** permite **tratar eficazmente tanto la fiebre como el dolor, limitando las molestias para el niño²**



Escanea el
código QR y
descubre los
contenidos
especiales

RECUERDA QUE LOS EFECTOS NO DESEADOS DE LAS VACUNAS:

- suelen ser impredecibles, casuales y de intensidad leve (¡las vacunas son seguras!)⁴
- se controlan fácilmente, a partir de la fiebre y del dolor²
- se ven ampliamente compensados por los beneficios de las vacunas, en comparación con los riesgos de las enfermedades⁴

