



LES EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES DES VACCINS

CE QU'IL FAUT SAVOIR

Comme tout médicament, les vaccins peuvent eux aussi provoquer des **événements indésirables**, par exemple :



ÉPAULE ET CUISSE

Rougeur ou gonflement du site d'injection : ils sont indépendants de l'opérateur et disparaîtront en quelques semaines²



CORPS

- L'enfant est « un peu mou » : il se sent mal ou est irritable pendant 24 à 48 heures mais facilement consolable²
- Éruption cutanée (exanthème) : elle survient le plus souvent après la vaccination contre la rougeole, 7 à 10 jours après l'injection, et disparaît spontanément³



ABDOMEN

Diarrhée : elle peut survenir avec les vaccins par voie orale tels que celui contre le rotavirus⁴




FIÈVRE ET DOULEUR

- **Fièvre** : comprise entre 38 et 38,5 °C et de courte durée (24 à 48 heures), sans conséquences
- **Douleur** : au siège d'injection, indépendamment des rougeurs ou des gonflements

DES EFFETS INDÉSIRABLES
LOCAUX C'EST-À-DIRE
AU SITE D'INJECTION OU,
PLUS RAREMENT,
DES EFFETS INDÉSIRABLES
GÉNÉRAUX, TELS QUE
LES RÉACTIONS ALLERGIQUES¹



Si nécessaire, l'utilisation d'**ibuprofène** ou de **paracétamol** permet d'**affronter efficacement la fièvre** tout comme la douleur, limitant ainsi l'inconfort de l'enfant²



scannez le
QR code
et découvrez
les contenus
spéciaux

N'OUBLIEZ PAS QUE LES EFFETS INDÉSIRABLES DES VACCINS :

- sont la plupart du temps imprévisibles, fortuits et de faible intensité (les vaccins sont sûrs !)⁴
- sont facilement contrôlables, à commencer par la fièvre et la douleur²
- sont toujours amplement contrebalancés par les effets bénéfiques des vaccins par rapport aux risques des maladies⁴

