



ACABAR CON LOS FALSOS MITOS SOBRE LAS VACUNAS Y LA FIEBRE

1. POSIBLES RIESGOS DE LA VACUNAS

¿Las vacunas pueden provocar autismo?

- **NO**. La cuestión se planteó en particular por la vacuna del sarampión-papera-rubeola³, pero numerosos estudios han demostrado la falta de fundamento de esta afirmación incluso en los niños de alto riesgo de autismo⁴.

En los primeros 24 meses, ¿pueden las vacunas afectar al desarrollo neuroconductual normal?

- **NO**, nunca se han observado diferencias entre niños vacunados según el calendario de vacunas y los vacunados más tarde⁵.

2. IDEAS PRECONCEBIDAS COMUNES

¿La administración simultánea de varias vacunas sobrecarga el sistema inmunitario?

- **NO**, incluso en los recién nacidos, el sistema inmunitario es capaz de responder simultáneamente a muchas agresiones y las vacunas combinadas no lo debilitan¹.

¿Es mejor inmunizarse de forma natural, es decir, enfermando, en lugar de hacerlo con las vacunas?

- **NO**, los posibles efectos secundarios de las vacunas (por ejemplo, fiebre, enrojecimiento y dolor en el lugar de la inyección) son mucho menores que las molestias, y sobre todo los riesgos, de las enfermedades que tratan de evitar².

3. FIEBRE DESPUÉS DE LA VACUNA

¿Existe una profilaxis para evitar la fiebre después de una vacuna?

- **NO**, se desaconseja una profilaxis rutinaria con un antipirético.
- Después de una vacuna, puede aparecer fiebre que se caracteriza por:
 - ✓ valores entre 38 y 38,5 °C
 - ✓ duración breve (24-48 horas)

4. DOLOR DESPUÉS DE LA VACUNA

Después vacunarse, ¿siempre duele la zona donde se ha puesto la inyección?

- **NO**, el dolor es un efecto secundario común que podría aparecer en la zona de la inyección, independientemente del enrojecimiento y la hinchazón.



Escanea el
código QR y
descubre los
contenidos
especiales.



Tomar **ibuprofeno o paracetamol** permite
tratar eficazmente tanto la fiebre como el
posible dolor en la zona de la inyección⁸

