

用心呵护 

有关
打破
疫苗和发热的流言

1 接种疫苗的潜在风险

疫苗是否会造成自闭症？

- **不会**，很多人会问到这个问题，尤其是接种麻腮风疫苗时³。但多项研究已证实，即使是针对自闭症高危儿童，这些说法都毫无根据⁴。

出生后 24 个月内接种疫苗是否会影响正常神经行为发育？

- **不会**，按时接种疫苗的儿童与延迟接种的儿童在这方面并无差别⁵

2 常见误解

接种多种疫苗是否会加重免疫系统负担？

- **不会**，婴儿的免疫系统已足够同时对多种侵犯做出反应，联合接种疫苗并不会削弱这种能力¹

生次病所获得的自然免疫是否比接种疫苗要好？

- **不会**，疫苗可能产生的任何副作用（如发热、注射部位泛红或疼痛）一般都比疾病轻，可以预防并减轻患病风险²

3 接种疫苗后发热

接种疫苗后是否有办法预防发热？

- **没有**，不建议用退热药预防发热。
- 接种疫苗后可能会发热，其特点表现为：
 - ✓ 发热体温在 38°C 至 38.5°C 之间
 - ✓ 持续时间短（24-48 小时）

4 接种疫苗后疼痛

接种疫苗后，注射部位是否会一直疼痛？

- **不会**，疼痛是常见的副作用，常出现于注射部位，无论是否红肿



扫描左侧
二维码
获取更多
详细内容



服用布洛芬或扑热息痛
可有效缓解发热和注射部位疼痛症状⁸