



COMMENT SIGNALER À SON PÉDIATRE

# LA FIÈVRE

LA FIÈVRE EST L'UN DES SYMPTÔMES LES **PLUS FRÉQUENTS**,  
JUSQU'À UN TIERS DES PROBLÈMES SOUMIS AUX PÉDIATRES<sup>1</sup>

UNE BONNE COMMUNICATION  
DE LA FIÈVRE AU PÉDIATRE  
EST FONDAMENTALE  
POUR UN TRAITEMENT  
ADAPTÉ.

IL EST DONC IMPORTANT  
POUR LES PARENTS  
D'OBSERVER L'ENFANT  
ATTENTIVEMENT ET DE  
FOURNIR CES INFORMATIONS  
AVEC PRÉCISION.<sup>2</sup>



## CARACTÉRISTIQUES

- Quelle est sa valeur maximale, où (endroit du corps) et comment (type de thermomètre) elle a été mesurée
- Comment est survenue l'augmentation de la température (soudainement ou progressivement ?)



## DÉROULEMENT

- Son évolution au cours de la journée (fluctuante ou stable ?)
- Présence éventuelle d'autres troubles (tels que vomissements, diarrhée, maux de gorge, toux, éruption cutanée)



## ASPECT DE L'ENFANT

- Coloration de la peau (rose, pâle, bleutée)
- Comportement (Est-il calme ou agité ? A-t-il de l'appétit ? Est-il irritable ou pleure-t-il ? A-t-il envie de jouer ?)
- Respiration (Est-elle régulière ? Difficile ?) et réaction aux stimuli
- Consulter un pédiatre pour l'éventuelle administration d'un antipyrétique et évaluer l'état de l'enfant toutes les 60 à 90 minutes (dort-il profondément ? Est-il agité ? Pleure-t-il ?)



## LA FIÈVRE POST-VACCINALE

- Valeurs de la fièvre (habituellement entre 38 et 38,5 °C)
- Durée de la fièvre (habituellement de courte durée (24 à 48 heures))



L'utilisation d'**ibuprofène** ou de **paracétamol** permet d'affronter efficacement la fièvre tout comme l'éventuelle douleur au site d'injection<sup>2</sup>



scannez le  
QR code  
et découvrez  
les contenus  
spéciaux

## À RETENIR :

Le pédiatre est toujours la référence, surtout si l'enfant a moins de 6 mois ou qu'il se sent très mal<sup>3</sup>.

En cas de fièvre, il vaut mieux ne pas forcer l'enfant à manger, mais l'inviter à boire<sup>3</sup>.

