



الآثار الجانبية المحتملة اللقاحات

ما ينبغي معرفته

التأثيرات الموضعية غير المرغوبة
في مكان اللقاح أو في الحالات النادرة
الآثار الجانبية
بشكل عام، كمضاعفات الحساسية

مثل أي دواء قد تسبب اللقاحات
أثار غير مرغوب فيها، والتي قد تكون:

الكتف والخذ

احمرار أو تورم مكان الحقن باللقاح: هذا غير متوقف على معطي اللقاح،
ويختفي الأثر خلال أسابيع قليلة ٢



الجسم

- "انخفاض نبرة الصوت قليلاً" لدى الأطفال: يسبب اللقاح شعورًا بالضيق أو التهيج لمدة ٢٤-٤٨ ساعة، ويمكن تهدئة ذلك بسهولة ٢.
- الطفح الجلدي: قد يحدث في كثير من الأحيان بعد التطعيم ضد الحصبة، لمدة ٧-١٠ أيام بعد الحقن ويختفي تلقائيًا ٣.



البطن

الإسهال: قد يحدث في حالة اللقاحات القموية كاللقاحات ضد فيروس الروتا ٤.



الحمى والشعور بالآلام

- الحمى: ترتفع حرارة الجسم بين ٣٨ و ٣٨,٥ درجة مئوية ولمدة قصيرة (٢٤-٤٨ ساعة)، ولكن بدون توابع.
- الشعور بالآلام: في مكان الحقن، ولا يترابط بالاحمرار أو التورم.



استخدام الإيبوبروفين أو الباراسيتامول عند اللزوم.
يسمح بالتعامل الإيجابي مع الحمى والألم، وبالتالي
الحد من عدم راحة الأطفال ٢.

تذكر أن الآثار الجانبية للقاحات:

- غالبًا ما تكون غير متوقعة وعشوائية وخفيفة (لقاحات آمنة!) ٤.
- يمكن السيطرة عليها بسهولة فما في ذلك الحمى والألم ٢.
- دائمًا ما يتم مقارنتها بفوائد اللقاحات فيما يتعلق بمخاطر الأمراض ٤.

