

# 温馨提示 疫苗

## 可能引发的副作用

与其他任何药物一样，疫苗也可能引发**不良反应**，  
比如：

**局部**不良作用，  
即注射部位或  
**全身性**不良反应（不常见），  
例如过敏反应<sup>1</sup>



### 肩部和腿

注射部位泛红或肿胀：这类反应与医务人员无关，几周后便可消失<sup>2</sup>



### 身体

- 孩子“有点儿无精打采的”：24~48 小时内她/他会感到不适、烦躁不安，别担心，很快就会好转<sup>2</sup>
- 皮疹（出疹子）：常发生于接种麻疹疫苗后 7~10 天，然后会自然消失<sup>3</sup>



### 腹部

腹泻：可能会出现于接种口服疫苗后，比如轮状病毒疫苗<sup>4</sup>



### 发热并伴有疼痛

- **发热**：一般在 38°C 至 38.5°C 之间，持续时间不长（24~48 小时），无任何后果
- **疼痛**：发生于注射部位，不管是否红肿



如有必要，服用布洛芬或扑热息痛  
可有效缓解发热和疼痛，  
让孩子感觉好些<sup>2</sup>



扫描左侧  
二维码  
获取更多  
详细内容

切记，疫苗的不良作用有以下特征：

- 大多数是随机发生，无法预测的，但表现也是温和的（疫苗很安全！）<sup>4</sup>
- 容易控制，尤其是发热和疼痛<sup>2</sup>
- 接种疫苗的好处远远超过了患病风险<sup>4</sup>

