

LES EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES DES

# VACCINS

CE QU'IL FAUT SAVOIR

Comme tout médicament, les vaccins peuvent eux aussi provoquer des **événements indésirables**, par exemple :

DES EFFETS INDÉSIRABLES  
**LOCAUX** C'EST-À-DIRE  
AU SITE D'INJECTION OU,  
PLUS RAREMENT,  
DES EFFETS INDÉSIRABLES  
**GÉNÉRAUX**, TELS QUE  
LES RÉACTIONS ALLERGIQUES<sup>1</sup>



## ÉPAULE ET CUISSE

Rougeur ou gonflement du site d'injection : ils sont indépendants de l'opérateur et disparaîtront en quelques semaines<sup>2</sup>



## CORPS

- L'enfant est « un peu mou » : il se sent mal ou est irritable pendant 24 à 48 heures mais facilement consolable<sup>2</sup>
- Éruption cutanée (exanthème) : elle survient le plus souvent après la vaccination contre la rougeole, 7 à 10 jours après l'injection, et disparaît spontanément<sup>3</sup>



## ABDOMEN

Diarrhée : elle peut survenir avec les vaccins par voie orale tels que celui contre le rotavirus<sup>4</sup>



## FIÈVRE ET DOULEUR

- **Fièvre** : comprise entre 38 et 38,5 °C et de courte durée (24 à 48 heures), sans conséquences
- **Douleur** : au siège d'injection, indépendamment des rougeurs ou des gonflements



Si nécessaire, l'utilisation d'**ibuprofène** ou de **paracétamol** permet d'**affronter efficacement la fièvre tout comme la douleur, limitant ainsi l'inconfort de l'enfant<sup>2</sup>**



scannez le  
QR code  
et découvrez  
les contenus  
spéciaux

N'OUBLIEZ PAS QUE LES EFFETS INDÉSIRABLES DES VACCINS :

- sont la plupart du temps imprévisibles, fortuits et de faible intensité (les vaccins sont sûrs !)<sup>4</sup>
- sont facilement contrôlables, à commencer par la fièvre et la douleur<sup>2</sup>
- sont toujours amplement contrebalancés par les effets bénéfiques des vaccins par rapport aux risques des maladies<sup>4</sup>

